

Newsletter nº 18 de 20 de Março de 2014

Caro(a) participante,

Assintomáticos: a ponta do iceberg

Três quartos das pessoas infectadas com o vírus da gripe não apresenta sintomas da doença. Investigadores britânicos testaram pessoas para detectar anticorpos da gripe antes e depois de cada temporada de gripe, durante cinco anos. Cerca de uma em cada 5 pessoas foram infectadas nos recentes surtos de gripe sazonal e na pandemia de gripe de 2009, mas apenas 23% das infecções causaram sintomas, e apenas 17% das pessoas estavam doentes o suficiente para consultar o médico, de acordo com o relatório agora publicado na revista 'The Lancet Respiratory Medicine'.



Os autores, liderados por Andrew C. Hayward, da University College London, afirmam que os casos de gripe detectados pelo sistema de vigilância nacional representam apenas a ponta de um enorme iceberg. "Subestimar o número de casos da comunidade leva a sobrestimar a gravidade da epidemia", concluem

Num comentário que acompanha o relatório, Peter William Horby, da Unidade de Pesquisa Clínica da Universidade de Oxford no Vietname, concorda que os resultados "reafirmam relatórios anteriores em que são mostradas altas taxas de evidência sorológica de infecção por Influenza sem a correspondente doença."

Dadas as elevadas taxas de doença subclínica, Horby acrescenta: "Uma pergunta importante ainda sem resposta é a medida em que infecções de gripe leves e assintomáticas contribuem para a transmissão. Um grande número de pessoas infectadas mas que se sente bem, convivendo com os restantes indivíduos na comunidade, poderia trazer uma contribuição substancial para a posterior transmissão".

O comunicado da Lancet sobre este estudo:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-03/tl-tqo031314.php

Últimas notícias

Pobreza entre os factores de risco
As 'preferências laborais' da gripe

